Lezion 5 Kette e piani nello spanio Rette in R3 Si P = (p1, p2, B) un pento d' R3, e v=(a1, a2, a3) + (0,0,0) e un vettou non nulls d' R', definises la retta che passe per L'ed e parollela a vi come fatto in R', cise come l'insieme dev pente X = (2, y, z) to che $X = P + t\vec{v}$ per questihe t e R.
Riaro parametriche e cartevani: (n, 4, 3) = (p, p, p,) + t(a, az, az) $\begin{cases}
2 = p_1 + ta_1 \\
y = p_2 + ta_2 \\
z = p_3 + ta_3
\end{cases}$ EDUAZIONI PARAMETRICHE DELLA RETTA r. P+to.

Hosso ricavari il parametro t de Una delle tu equarioni (una qualuque in cui il parametro t compan, e una soppiamo the l'e perchi almeno uno tra Q1, Q2, Q3 e Mon Fero). Sotituendo il parametro t con icavoto nelle due altre eguarion attergo le EQUAZIONI CARTETIANE (d, 2+ B, y+ x, 2+ 8, =0 1 den + Bry + Yz & + 82 = 0 Esemus Retta per (1,2,1) e parollela 0 (-1,0,3). (n,y,z) = (1,2,1) + t(-1,0,3)PARA ($\alpha = 1 - t$) $\zeta = 1 - x$ METR y = 2 y = 2 y = 2 z = 1+3(1-n)Sy = 2 CARTESIANE (3n+2-4=6)

Pian in 123 Fisso en pento Pe due vettor ve W, entramm non mull, e non multipli 1'uno dell'altro Allora il prano T passante pur l'e parollels a re vi e X = P+ Av + uw con $\mathcal{I}, \mathcal{M} \in \mathbb{R}$. (0,0,0)In Condinate: P=(p1, P2, P3), V=(a1, a2, a3), W=(b1, b2, b1) $(\lambda, \mu, \overline{t}) = (p_1, p_2, p_3) + \lambda(a_1, a_2, a_3) + \mu(b_1, b_2, b_3)$ EQUAZIONI PARAMETRICHE DI TI:

Os & v=(a1,0,0), w=(61,0,0) a, to, b, to, allow N = b1 v, che abbiamo esiluso.

(penh' abbiamo richiesto che ve w non fosses meltiple I'uno dell'altro). Penis a, a, a, a e b, bz, & sono non mulle "in posti diveri", permetrendo d' ricavan s'a à che pe da due delle Equanor parametiche. Sostituendo nella terra, ottengo le EQUAZIONI CARTESIANE T ! an + by + CZ + & = 0 / Con (a,b,c) \ (0,0,0).

Escrito Saiver equanoni parametiche e cartesiane del promo
$$\pi$$
 passante per $\mathbb{R} = (2, -2, 1)$ e parallelo ai vettoi $\overrightarrow{N} = (1, 1, 2)$ e $\overrightarrow{N} = (0, -2, 3)$.

Slavone Savo le parametiche per pume: $(2, 4, 2) = (2, -2, 1) + \lambda(1, 1, 2) + \mu(0, -2, 3)$
 $(2 = 2 + \lambda)$
 $(2 = 2 + \lambda)$
 $(3 = 2 + \lambda)$
 $(3 = 2 + \lambda)$

Ricaro le carteriane:

Ricaro le carteriane:

Ricaro le carteriane:

Ricaro le carteriane:

 $(3 = 2 + \lambda)$
 $(3 =$

$$\begin{cases} \lambda - n - 2 & parraggo intendo' \\ p = -\frac{1}{2}y - 1 + \frac{1}{2}(n - 2) = -\frac{1}{2}y - 1 + \frac{1}{2}n - 1 \\ 2 = 1 + 2(n - 2) + 3(-\frac{1}{2}y + \frac{1}{2}n - 2) \end{cases}$$
Gemply is be the eq.

$$2z = 2 + 4n - 8 - 3y + 3n - 12$$

$$[\pi: 7n - 3y - 2z - 18 = 0]$$
Come rul cano delle rette, noto che i coefficienti del piano formano un vettori $(7, -3, -2)$ che e $\neq (0, 0, 0)$ e che e perpendidan a entrombi \vec{x} e \vec{x} : import \vec{x} e \vec{x} e \vec{x} : import \vec{x} e $\vec{x$

 $(0, -2, 3) \cdot (7, -3, -2) = 6 - 6 = 0.$ Chiano de wi vetta de toi de t Conclusione: On prans Tre' descrito de un' equasione del tipo an+ by t C + d = 0 Il vettou (a, b, c) + (0,0,0) ed e perpendicolan ad entrambe le direvioiri del prano. (a,b,e)

Escrisio son il prano di equanione T: Zn-y+32-5=0 e va P = (2,4,1). (a) Scriver le equarin parametriche e carteriane della retta per P perpentulae La drunon della retto ceresto, che cheamo r, e(2, -1, 3)(t: 2n-y+32-5=6). Peus parametiche dr sono $\begin{cases} n = 2 + 2t \\ y = 4 - t \end{cases}$ (n, 418) = (2,4,1) + t(2-1,3)P vettou 1
a to 1 2=1+34 ortogorol. Carteran? 2 = 2+2 (4-4) 1 t = 4-y Z = 1+3(4-4)

$$n = 10-2\left(\frac{27}{7}\right) = \frac{70-56}{7} = \frac{16}{7}$$

$$2 = 13-3\left(\frac{27}{7}\right) = \frac{10}{7}$$

$$1 = \left(\frac{16}{7}, \frac{27}{7}, \frac{10}{7}\right)$$

$$\frac{O_{1}}{2} + \frac{O_{2}}{7} + \frac{O_{$$

la soma o la diffeuma delle du Equarioni. Questo posso farlo penti: $A_1 = B_1$ $A_2 = B_2$ $A_1 - A_2 = B_1 - B_2$ ecutiva Oss. 2 Simulmente, i pran T: Za-y+37=4 T: Gn-2y+67=8 sono lo stesso promo: se moltiplico Un'eq. per un numero #0, l'eq. non cambia. Os 3. Sul pento (6) dell'es, precedente: Troon H = rn T. Hosso anche lavoror "misto" con le parametriche d'r e le carte vani a t.

J2=2+2+ Per trovon 4, posso trovor per gust' Volori d' t'il punto generio de r (2+2t, 4-t, 1+3t)Valice l'equasione d' T. Con? 2(2+2t)-(4-t)+3(1+3t)-5=04+4t-4+t+3+9t-5=0 14t = 2 => t = 1/9 Perio H= (2+ =, 4- =, 1+ 3. =) $=\left(\begin{array}{c} 16\\ \hline 9\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c} 29\\ \hline 9\end{array}\right)$ Der 4. Una retta e intername d' du prani:

equasione del I piano, the

Arec e volumi la prima domanda che ci poniamo e Come chedae l'area del parolle lagranno d R²

P=pandlelagroms d lots v w

N h

A v Ana $(P) = kan \times aterra$ $\frac{1}{2} \| \vec{v} \| \cdot k + \vec{v} \| \cdot sin(\alpha)$ $\frac{1}{2} \| \vec{v} \| \cdot \| \vec{w} \| \cdot sin(\alpha)$ In Codinate: $\overline{N} = (a_1, a_2)$ ~ (b1, b2)



